

# Avertissements agricoles



Bulletin n° 25 du 21 septembre 1988

Numérotation continue : n° 77

COLZA : Surveillez les altisesCEREALES : ATTENTION AUX LIMACES !COLZA :

Les colzas (non détruits par les limaces) sont levés et le plus souvent au stade cotylédon à 1ère feuille pointante.

- Situation :

- . De nombreux et importants dégâts de limaces ont été constatés (absence de levée) obligeant à des resemis.
- . Les altises ont été piégées dans plusieurs régions (Pays Haut, région de NANCY, vallée de Seille, sud meusien notamment). Les dégâts sont généralement assez restreints, inférieurs au seuil de nuisibilité.
- . On observe dans quelques parcelles la présence de mildiou.

- Préconisations :

- . Limaces : continuez à surveiller leur présence jusqu'au stade 2 à 3 feuilles et tout particulièrement dans les parcelles réensemencées. Retraitez, si nécessaire, dès la présence constatée de nouveaux cadavres sous les pièges.
  - . Altises : Bien observer l'arrivée des altises dans la cuvette jaune. Intervenir dès que 3 pieds sur 10 présentent des morsures.
- Si vous capturez plus de 20 à 30 insectes dans votre cuvette (captures cumulées), intervenez également, même si moins de 3 pieds sur 10 sont attaqués. Cette intervention permettra de limiter les pontes et évitera un traitement aléatoire sur larves en début d'hiver.

CEREALES :ATTENTION AUX LIMACES

Vous semez vos parcelles d'orge et bientôt de blé. Ne vous laissez pas surprendre par les limaces qui peuvent faire les mêmes dégâts que sur colza.

Si avant le semis vous observez déjà leur présence (piégeage, dégâts sur repousses...), vous pouvez mélanger un anti-limace à votre semence, soit en fabriquant vous même votre mélange (bétonnière) en ajustant la quantité de molluscicide à la surface (ex. : si vous semez 200 kg

Imprimerie de la Station de NANCY

Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication Périodique

CPPAP N° : 2011 AD

Abonnement annuel :

185 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38, rue Sainte-Catherine

54043 NANCY CEDEX

Tél. 83 30 41 51

Tél. : 83.30.41.51



P-124

de semence/ha, apportez 1,5 kg de MESUROL par quintal de semence), soit en vous approvisionnant auprès de vos organismes distributeurs habituels.

Même si vous traitez les semences, continuez à surveiller très régulièrement l'éventuelle présence des limaces sous les pièges. Les parcelles les plus exposées sont celles sur lesquelles :

- . vous observez assez régulièrement des dégâts depuis plusieurs années,
- . vous enfouissez d'importantes masses végétales (fumier, paille, repousses de colza, engrais verts, mauvaises herbes...),
- . vous constatez de nombreuses fissurations dans le sol (terres craquelées, pier-reuses, motteuses...),
- . l'humidité en surface et profondeur se prolonge.

N'hésitez pas à rappuyer les sols creux ou motteux.

Traitez (ou retraitez) dès que vous constatez la présence de cadavres sous vos pièges.

Les céréales peuvent souffrir des dégâts de limaces jusqu'au stade 2 à 3 feuilles environ, mais la période la plus critique est souvent celle comprise entre la germination et la sortie de la 1ère feuille car la plus insidieuse, les dégâts restants invisibles à la surface du sol.

\*\*\*\*\*

#### RECTIFICATIF au N° 23 du 07 septembre 1988 :

Page 4 : tableau desherbage colza :

Dose d'utilisation KERB FLO : 1,8 l

contre avoine à chapelet : 2,5 l

contre chiendent : 3,7 l

Ne pas mélanger KERB ULTRA à CLERDONE.

